

វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង

ស្ពៃជ្រូក

ក្រោយពេលប្រមូលផល



មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
Centre d'Etude et de Développement
Agricole Cambodgien



វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីស្ថាបនាជនបទឡើងវិញ
International Institute of Rural
Reconstruction

ឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិ ម៉ាកណាយ
Funded by McKnight Foundation

១) ការប្រមូលផល

ចំពោះដំណាំស្ពៃ គេអាចប្រមូលផលនៅពេល
ដែលគេសង្កេតឃើញថា :

- មានស្រទាប់មេរៀស្តិតនៅលើផ្ទៃក្នុងរបស់វា
- វាពេញអាយុ គឺពី ២ ខែទៅ ២ ខែកន្លះ
- ប្រមូលផលនៅពេលដែលមេឃត្រជាក់ ហើយស្ងួត
សំណើម ព្រោះធាងរបស់វាស្រួយណាស់នៅពេល
មេឃត្រជាក់ (ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៩ និងពេល
រសៀលចាប់ពីម៉ោង ៣) ។ ក្នុងការប្រមូលផល គឺគេ
កាត់ ដោយប្រើកូនកាំបិតដែលមុតល្អ
- ពេលកាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការប៉ះទង្គិច
ខ្លាំង ។





- ត្រូវប្រមូលស្ពៃជ្រូកចូលក្នុងម្លប់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីកាត់
ហើយ ជៀសវាងកុំឱ្យវាត្រូវកំដៅថ្ងៃ

២) ការសំអាត

- ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច គេមិនលាងសំអាតដោយទឹកទេ ព្រោះវាអាចបៀមទឹក និងធ្វើឱ្យស្ពៃឆាប់ជាង និងងាយរលួយ ។ គេគ្រាន់តែកាត់ស្លឹកដែលចាស់ៗចោល តែប៉ុណ្ណោះ
- រួចដាក់សំដីលក្រោមម្លប់រយៈពេលពី ៣០ នាទី ដោយយោងទៅតាមអាកាសធាតុក្តៅ ឬត្រជាក់
- កុំឱ្យស្រពោនពេក តែច្របាច់ទៅមិនបាក់
- ត្រូវបេះស្លឹករលួយចេញដើម្បីកុំឱ្យឆ្លង ។

មានទ្រាប់ និងគ្របពីលើដោយប្រើស្លឹកស្រស់ (ស្លឹកចេកស្រស់) ។ ការតំរៀប គឺដាក់គល់ស្ពៃចេញក្រៅ ហើយជារង្វង់ បើដាក់ក្នុងកញ្ចប់ ។ កុំដាក់ឱ្យវាពេញហួសមាត់កញ្ចប់ ។




៣) ការជ្រើសរើស ឬដេចខ្ទប់

បន្ទាប់ពីសំដីលរួច គេតំរៀបចូលទៅក្នុងខេងដែក កញ្ចប់ដែលមានរុំបាវ ឬដាក់លើរ៉ូម៉ែក ឬឡានតែម្តង ដោយ


៤) ការដឹកជញ្ជូន

- ការដឹកជញ្ជូន គឺគេអាចដឹកបាននៅពេលព្រឹក រសៀល និងពេលយប់ ដោយម៉ូតូ រ៉ូម៉ែក ឬឡាន ទៅកាន់ទីផ្សារ

- រៀបកញ្ចប់ជាថ្នាក់ៗ ហើយជៀសវាងការអង្កុយលើ ឬដាក់អ្វីធ្ងន់ពីលើនាំឱ្យបាក់បែក ឬក្តៅហប់រលួយ
- ខេងត្រូវរៀបជាថ្នាក់ៗ ដោយមានលើកល់
- ត្រូវគ្របខេងនឹងក្រណាត់សើមការពារធូលី ។



ពេល ២ យប់ អាចបាត់បង់រហូតដល់ ៣៥% តែវាអាចយក ទៅធ្វើជ្រក់បាន។ ដាក់សំដីលកន្លែងម្តប់ ហើយពេលយប់ អាចដាក់ឱ្យត្រូវសន្សើមបាន តែមិនឱ្យត្រូវថ្ងៃទេ។ នៅ ពេលដែលយើងស្តុកទុកអាចប្រើប្រាស់កំបោរ ឬសាច់ជូរ លាបគល់របស់វាដើម្បីឱ្យអាចរក្សាទុកបានយូរ។



៥) ការស្តុកទុក

ស្តែជ្រក់អាចទុកបាន ១ យប់ ២ ថ្ងៃ ដោយ គេធ្វើការសំដីលវានៅលើគ្រែ នៅពេលយប់ទុកវាហាល សន្សើម និងពេលថ្ងៃយកចូលម្តប់។ បើសិនជាទុករយៈ

កសិករមានបទពិសោធន៍ និង បានធ្វើការសាកល្បង

សី សុង ម៉ៅ ចិញ្ច និង វិញ្ច ស៊ាម