



# ពូជពោត "លឿងមង្គល"

ពូជ "លឿងមង្គល" គឺជាពូជពោតដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរយៈ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្នពូជពោត "លឿងមង្គល" បាននឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជាកសិករ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

## លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជពោត "លឿងមង្គល"

### លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

ពូជពោត "លឿងមង្គល" មានលក្ខណៈដើមដងរឹងមាំ ស្លឹកមានពណ៌បៃតងចាស់ ហើយដុះលូតលាស់យ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីដាំបាន ១៥-២០ ថ្ងៃ។ ប្រព័ន្ធប្រសមានការដុះលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង មានតួនាទីទប់ដើមមិនឲ្យដួលរលំដោយសារខ្យល់ និងនៅពេលដើមចាប់ផ្តើមស្ងួតបូង។ ដើមមានកម្ពស់ជាមធ្យមពី ២ ទៅ ២.៥ ម៉ែត្រ។ កម្ពស់ផ្លែពីដីគឺពី ៨៥ សង់ទីម៉ែត្រ ទៅ ១ ម៉ែត្រ។ ផ្លែមានរាងទ្រវែងប្រវែងពី ១៥ សង់ទីម៉ែត្រ រហូតដល់ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ។ គ្រាប់មានពណ៌លឿងចាស់រាងដូចធ្មេញកោងរលោងផ្នែកខាងខ្នង ចំនួនជួររបស់គ្រាប់ក្នុងមួយផ្លែពី ១២-១៦ ជួរ និងទម្ងន់ ១០០០ គ្រាប់ស្មើនឹង ៣០០ ក្រាម។ ពូជពោត "លឿងមង្គល" អាចផ្តល់ទិន្នផលជាមធ្យមគឺ ៤.០ តោន ក្នុងមួយហិកតា ហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌអាចផ្តល់ផលរហូតដល់ ១០ តោន ក្នុងមួយហិកតា។ ការដាំដុះពូជពោត "លឿងមង្គល" លើផ្ទៃដីមួយហិកតា ត្រូវការពូជពី ៣០ ទៅ ៣៥ គីឡូក្រាម (ដាំ ២-៣ គ្រាប់ ក្នុងមួយគុម្ភ)។



### វិនិស្ស័យដាំដុះ

គេអាចធ្វើការដាំដុះដំណាំពោតបានពេញមួយឆ្នាំ ដោយការបុកដាំ ការដាំជាជួរ ឬដាំតាមចង្កូរដូចតារាងខាងក្រោម។ មុនពេលដាំត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកត្រាំទឹកឲ្យបានពី ៤-៦ ម៉ោង ដើម្បីឲ្យគ្រាប់រីកឆាប់ដុះ (តំបន់ដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់)ដោយដាក់គ្រាប់ក្នុងមួយរណ្តៅពី ២-៣ គ្រាប់ និងជម្រៅពី ២-៤ ស.ម។ ត្រូវធ្វើការស្រោចស្រពដ៏ឲ្យបានជោគជ័យពេលដាំ (នៅរដូវប្រាំង)។ ចំពោះតំបន់ដាំដុះដែលរំពឹងទឹកភ្លៀង គឺយើងត្រូវដាក់ដាំគ្រាប់ផ្ទាល់តែម្តង ដោយមិនចាំបាច់ត្រាំទឹកទេ។ ការកាត់រំលោះដើម គឺ

ចន្លោះជួរ (ស.ម)	ចន្លោះគុម្ភ (ស.ម)	
	ដើម/គុម្ភ	ដើម/គុម្ភ
៦៥	៣០	៦០
៧០-៨០	២៥	៥៥
៨៥-៩៥	២០	៤០

អាចធ្វើនៅពេលកូនដំណាំមានអាយុបាន ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ ដោយទុកតែមួយដើមក្នុងមួយគុម្ភ និងធ្វើការសម្អាតស្មៅឲ្យស្អាត ចៀសវាងការប្រដែងស្រូបយកដីជាតិពីដំណាំ ដែលធ្វើឲ្យដំណាំក្រិនមិនសូវលូតលាស់ និងផ្តល់ផលតិច។

### ការដុះលូតលាស់

ការធ្វើដីបានផុសល្អ ដីមានជីជាតិ សំណើមគ្រប់គ្រាន់ និងធាតុអាកាសអំណោយផលនោះក្រោយពីដាំបានចំនួន ៥-៦ ថ្ងៃ គ្រាប់ចាប់ផ្តើមដុះពន្លកទូលដើមកខាងលើ និងក្រោយពីដាំបានចំនួន ១៥-២០ ថ្ងៃ ការដុះលូតលាស់របស់ពូជនេះប្រព្រឹត្ត

ទៅយ៉ាងលឿន និងមានកម្ពស់ពី ៥០-៧០ សង់ទីម៉ែត្រ ដើមថ្លោស ស្លឹកឡើងពណ៌បៃតងស្រងាត់។ ពូជនេះចាប់ផ្តើម ចេញផ្កាល្អោល នៅពេលបានអាយុកាល ៥០-៥៣ ថ្ងៃ ក្រោយពីដាំ និងចេញផ្កាញីនៅពេលបានអាយុកាល ៥៣-៥៥ ថ្ងៃ ក្រោយពីដាំ និងចាប់ផ្តើមទុំនៅរយៈពេល ៥៥-៦០ ថ្ងៃ ក្រោយពីចេញផ្កាញី។

**ការប្រើប្រាស់ដី**

ការប្រើប្រាស់ដីតាមបច្ចេកទេស និងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលា ធ្វើឲ្យដំណាំដុះលូតលាស់ល្អ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ ដី ដែលអាចប្រើប្រាស់ គឺអាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម (N : P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> : K<sub>2</sub>O)។ កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ដី អាចប្រែប្រួលទៅតាម ប្រភេទដី។ ការប្រើប្រាស់ដី ចែកចេញជាបីដំណាក់

កាល គឺដាក់ទ្រាប់បាតមុនពេលដាំ ដោយប្រើប្រាស់ ដីអាសូត (៥០ ភាគរយ) ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម (១០០ ភាគរយ) ចំណែកអាសូតនៅសល់ (៥០ ភាគរយ) ប្រើសម្រាប់ដាក់បំប៉នចំនួនពីរលើកទៀត គឺលើកទី ១ (២៥ ភាគរយ) ក្រោយពីដាំបាន ២០-២៥ ថ្ងៃ និង បំប៉នលើកទី ២ (២៥ ភាគរយ) ក្រោយពីដាំបាន ៤០

ដី	កម្រិតដីទៅតាមប្រភេទដី (គ.ក/ហ.ត)			
	ដីខ្សាច់ (ព្រៃខ្មែរ ប្រទះឡាង)	ដីតដូ (កំពង់សៀម ឡាបានសៀក)	ដីកណ្តោង (ទួលសំរោង)	ដីល្បាប់ (កៀនស្វាយ)
អ៊ុយរ៉េ	១២៤	១៧៤	១៧៤	១៥០
ដេ អា ប៊េ	៩៥	១០៧	១០៧	៨៥
ប៉ូតាស្យូម	៣៧	៤៥	៣៧	៥៤

-៤៥ ថ្ងៃ។ ការដាក់ដី គឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគល់ពី ១០-១៥ ស.ម រួចពូជដីលប់ឲ្យជិត ដើម្បីទប់គល់ពោតផង និង ការពារដីមិនឲ្យបាត់បង់តាមរយៈការហើរទៅក្នុងបរិយាកាស និងការហូរច្រោះដោយសារទឹក។

**ការប្រមូលផល**

គេអាចប្រមូលផលពោត នៅពេលដើមពោតចាប់ផ្តើមប្រែពណ៌ពីសំបកក្តាមទៅលឿងស្លឹក ឬដាប់ដើម សំបកផ្លែមានពណ៌ លឿងស្លឹក ហើយស្រួយសក់ពោតឡើងស្លឹក ឬសម្គាល់មួយផ្នែកទៀតនៅលើគល់របស់គ្រាប់ឡើងពណ៌ប្រផេះ គឺនៅ ពេលពោតបានអាយុកាលពី ១០០-១១០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលផលនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំ អាច ធ្វើឲ្យផលនៃគ្រាប់ពោតធ្លាក់ចុះ និងបាត់បង់គុណភាព ដោយសារទឹកភ្លៀងជ្រាបចូលក្នុងផ្លែបណ្តាលឲ្យគ្រាប់ដុះ ឬកើត ជំងឺផ្សិតលើគ្រាប់។

**ការទុកដាក់ក្រោយពេលប្រមូលផល និងការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ**

ជាមធ្យមសំណើមគ្រាប់ក្រោយពេលប្រមូលផលគឺពី ១៨-២០ ភាគរយ ដូច្នេះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការហាលសម្ងាត់បន្ថែមទៀតដោយកម្ដៅថ្ងៃ។ ត្រូវ ឧស្សាហ៍ប្រែត្រឡប់គ្រាប់ខណៈកំពុងហាលដើម្បីឲ្យគ្រាប់ឆាប់ស្ងួតល្អ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការហាលសម្ងាត់ និងទុកដាក់គ្រាប់ពោតមិនបានល្អ ក្រោយពេលប្រមូលផល អាចធ្វើឲ្យកើតសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាខ្នុតជា ដើមដែលវាស៊ីបំផ្លាញគ្រាប់ពោតតាំងពីនៅលើដើម រហូតដល់គ្រាប់នៅ ក្នុងកន្លែងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់គុណភាព ដូចជាគ្រាប់កើតជំងឺផ្សិតផ្សេង គ្រាប់ឡើងផ្លូវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រាប់ ពោតធ្លាក់ចុះ។ ពូជពោត “លឿងមង្គល” ជាពូជដែលអាចរក្សាគ្រាប់ពូជ ទុកដាំដុះនៅរដូវបន្ទាប់ទៀតបាន មិនដូចពូជពោតអ៊ីប៊ីដេ ប្រសិនបើយើងដាំដុះ វានៅដាច់តែឯងគ្មានពូជពោតផ្សេងនៅ ក្បែរ។ ការរក្សាគ្រាប់ពូជទុកសម្រាប់ប្រើនៅរដូវបន្ទាប់ត្រូវមានសំណើមពី ១៣-១៥ ភាគរយ គឺទុកនៅកន្លែងស្ងួតល្អ ឬរក្សា ទុកក្នុងធុងបិតជិត ឬអាចទុកដាក់ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារសត្វល្អិត។



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង ការិយាល័យរុក្ខដាំស្រូវ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន ការិយាល័យផែនការ សហប្រតិបត្តិការ និងពាណិជ្ជកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៣ សង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌដង្កោ ភ្នំពេញ ឬតាមប្រអប់សំបុត្រលេខ ០១ ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ៖ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤ គេហទំព័រ: [www.cardi.org.kh](http://www.cardi.org.kh) ទូរអគ្គី: [pbreed@cardi.org.kh](mailto:pbreed@cardi.org.kh) [trin@cardi.org.kh](mailto:trin@cardi.org.kh) [hunyadana@cardi.org.kh](mailto:hunyadana@cardi.org.kh)