


តារាងសារធាតុចូល

ផ្នែកបរិភោគ	ទឹក	ថាមពល	ប្រូតេអ៊ីន	ប្រេង	សរសៃ	កាបូអ៊ីដ្រាត	វីតាមីន
ទំងន់	ក្រាម	កាឡូរី	ក្រាម	ក្រាម	ក្រាម	ក្រាម	ក្រាម
១០០ក្រាម	៩៥.២	២២០	០.៣	០.២	០.៤	៣.៥	០.៤

ផ្នែកបរិភោគ	Ca	P	Fe	Caro	Thiamin	Ribo	Nia	Vic
ទំងន់	mg	mg	mg	Ug	mg	mg	mg	mg
១០០ក្រាម	៣២	១៤	១.៤	១៦៩	០.១១	០.០៨	០.៣	២៦



ដំណាំ ត្រសក់ ស្រូវ ច



I. ស្ថានភាពទូទៅ


ត្រសក់ស្រូវជាប្រភេទដំណាំមួយ ដែលត្រូវបានគេនិយមចូលចិត្តបរិភោគ ទាំងផ្លែខ្ចី និងផ្លែទុំ ។ វាត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងគ្រួសារ Cucurbitaceae លំដាប់ជាក្រុម Cucumis Spp ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រហៅថា Cucumis milo (Naudian ១៨៥៩ និង Kurz ១៨៧៧)។ ការនិយមចូលចិត្តទាំងផ្លែខ្ចី និង ទុំដោយសារតែមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាងដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់សរីរាង្គកាយ ។ ក្នុងទំងន់ ១០០ក្រាម ដែលបរិភោគបានមានសារធាតុសំខាន់ៗដូច ក្នុងតារាងខាងក្រោម:



ការជ្រើសរើសពូជត្រូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រណែនាំសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម:

- អត្រាដំណុះ: ពូជដែលអាចយកទៅដាំបានមាន ភាគរយដំណុះ ពី ៨៥-៩%។
- ភាពសុទ្ធនៃពូជ: ពូជត្រូវបានជ្រើស និង សំរិទ្ធសំរាំងតាមបច្ចេកទេសនៃពូជ ត្រឹមត្រូវគ្មានជាប់មកជាមួយនូវភ្នាក់ងារបន្តរោគ និងសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗ។
- អាយុកាលទុកដាក់: ជាធម្មតាពូជត្រសក់ស្រូវមានដំណេកគ្រាប់យូរខែជាងពូជត្រសក់ឯទៀតចន្លោះពី ៦-៨ ជាមធ្យម (Seed Dormancy) ទើបអាចមានលទ្ធភាពបន្តពូជបាន បើពុំទាន់ផុតដំណេកត្រសក់មិនអាចផលិតបានផ្កាញីឡើយ ។

២- ការជ្រើសរើស និងអ្រូបចម្រើ



II. បច្ចេកទេសដាំដុះ

១- ការជ្រើសរើសពូជ

ដើម្បីឱ្យការដាំដុះទទួលបានលទ្ធផលល្អ ការជ្រើសរើសពូជជាបញ្ហាចំបង ព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានប្រភេទពូជជាច្រើន ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងក្នុងស្រុក និងពូជនាំចូល ពូជក្នុងស្រុកជាពូជគ្មានជំនាន់ ហៅថាពូជបង្កាត់សេរី OPV តែដោយ ឡែកពូជនាំចូលភាគច្រើនជាពូជកូនកាត់មានជំនាន់ Hybrid F ។ តែទោះជាមានការនាំចូលពីប្រទេសនានា ក៏កសិករកម្ពុជាយើងនៅតែធ្វើការដាំដុះពូជប្រពៃណីយ៉ាងច្រើនលើសលប់ ព្រោះគេអាចរក្សាទុកដោយខ្លួនឯងបាន ប្រសើរជាងការដាំពូជនាំចូលព្រោះ វាមានភាពបន្ស៊ាំទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុជាច្រើនជំនាន់រួចមកហើយ ។



គ្នាល្អៗហា.ត ប្រើពូជ ១,៨-២,២ គ.ក្រ ។ ពេលយកទៅដាំត្រូវលាយជាមួយថ្នាំ ការពារ ជំងឺផ្សិតបន្តិចៗ (១គ.ក្រពូជ = ២-៣ ក្រាមថ្នាំ)។ ចំពោះរណ្តៅនៅ លើរងត្រូវយក ដីធម្មជាតិទៅដាក់បាតរណ្តៅ ដោយលាយជាមួយគ្រាប់ថ្នាំ Furadan បន្តិចៗក្នុងករណីធ្វើទៅ បានយកដីជូស្វាតទៅលាយជាមួយដីធម្ម ជាតិក្នុងកំរិត ១០០-១៥០គក្រ ១ហត ហើយលុបដីឱ្យជិត និងដាំដុះតាម ក្រោយ មួយរណ្តៅចំនួន ៣-៤គ្រាប់ ជំរៅ ២-៣ សម ដោយគ្របកំទិចចំបើង ស្ងួតពីលើហើយស្រោចទឹកផ្សេងរណ្តៅឱ្យសើម។



ត្រសក់ស្រូវក៏ដូចជាត្រសក់ឯទៀតដែរ វាជាប្រភេទរុក្ខជាតិប្រចាំរដូវមាន ប្រពន្ធិឫសរាក់ បរិមាណឫស សំយោគតិចអាយុកាលនៃការបន្តពូជរហ័ស ដូចនេះវាទាម ទារនូវប្រភេទដីដែលផ្តល់សក្តានុពលពីធម្មជាតិបានជា បង្ករ ។ ដូចនេះគេត្រូវធ្វើការ ជ្រើសរើសដីឱ្យសមស្របដូចជា មានដីជាតិពីធម្មជាតិ ស្រទាប់ដាំដុះជ្រៅជ្រាបទឹក រហ័ស ភាគច្រើនជាប្រភេទដីក្រហមខ្ពង់រាប ដីភ្នំ ដីល្បាយខ្សាច់ និងដីល្បាប់មាត់ ទន្លេ ស្ទឹង បឹង ជាដើម សំបូរ ទៅដោយសារ ធាតុមមោក ត្រសក់ស្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្រុម ធន់ទ្រាំមធ្យមទៅនឹងភាពអាស៊ីតនៃ ដី អាចដុះលូតលាស់បានចន្លោះ pH ៥,៥-៦,៨ ដើម្បីឱ្យការដាំដុះប្រព្រឹត្តិទៅ បាន គេត្រូវរៀបចំដីឱ្យបានល្អ ដោយរាស់ប្រមូលយកស្មៅ កាកសំណល់ផ្សេ ងៗចេញពីចំការ ភ្ជួរដីឱ្យជ្រៅ ហាលដីឱ្យស្ងួតបានច្រើនលើក រាស់បំបែកដី ឱ្យល្អិត និង ច្រើនសារហើយលើកជារង ដែលមានកំពស់ ២០-២៥ស.ម ទទឹងរង ១២០-១៥០សម កៀរដីឱ្យ ស្មើលើរងនិមួយៗបន្ទាប់មកកាប់ជា រណ្តៅចំកណ្តាលរងជំរៅ១០-១៥សម ចន្លោះពីររណ្តៅមួយទៅមួយ៧០សម ។

៣- ការដាំដុះ

មុននឹងដាំគេត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកសំអាតជាមុន ហើយដាក់ហាលថ្ងៃ ឱ្យក្តៅ រយៈពេល ១-២ម៉ោង ក្រោយមកយកទៅត្រាំទឹក ៤-៥ម៉ោង ហើយ លាងសំអាត នឹងទឹកឱ្យស្អាតចំនួន ៣-៤លើក ទើបយកទៅផ្តាប់ ទុក១យប់ ដើម្បីឱ្យគ្រាប់ពូជ មានការវិវត្តន៍ផ្នែកអំប្រើយ៉ុង តាមរយៈកំដៅ និងសំណើម ធ្វើឱ្យត្រសក់ដុះស្មើ។



រហូតដល់ប្រមូលផលវាទាមទារនូវសំណើមយ៉ាងល្អសំរាប់ជំនួយដល់ការបន្ត
 ពូជកាល ណាកង្វះទឹកក្នុងវគ្គនេះធ្វើឱ្យបាត់បង់នូវភាគរយយ៉ាង ច្រើនសំរាប់
 ការរីកចំរើនធំធេងនៃផ្លែ ។ នៅក្នុងវគ្គនេះដែរត្រូវផ្តល់ទឹកចំនួន ៧-១០ ថ្ងៃ ម្តង
 ទៅតាមប្រភេទដី អាកាសធាតុ និងវិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់ដូចជាបាញ់ទឹកផ្សេង
 ពីលើ ឬបញ្ចូលទៅ តាមចន្លោះជួរ ។ វាជាដំណាំដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងភាពរាំង
 ស្ងួត ហើយធន់ទ្រាំទៅ នឹងអត្រានៃការកើនឡើងសំណើមផងដែរ ។

៥- ការជ្រុំជ្រួយដី និង កំចាត់ស្មៅ



គេអាចដាំបានស្ទើរពេញមួយឆ្នាំព្រោះដំណាំនេះធន់ទ្រាំ ទៅនឹងអាកាសធាតុ
 ក្តៅជាងគេចន្លោះពី ២៥-៣០ °C តែពិសេសនៅរដូវទឹកស្រកជាការប្រសើរ ។

៤- ការស្រោចស្រព



ការផ្តល់ទឹកដល់ដំណាំ វាជាប្រភពនៃការបំបែក និងបំបែកធាតុនៃសារធាតុ
 ចិញ្ចឹមយ៉ាងសំខាន់ ប៉ុន្តែត្រូវគោរពទៅវគ្គលូតលាស់របស់វា ដំបូងវាត្រូវការ
 សំណើមជាមធ្យម រហូតដល់ពន្លត់ទងមានសន្លឹក ២-៣ សន្លឹក ក្នុង ករណីដី
 តាមតំបន់ខ្ពង់រាបខ្លះ សំណើម តែដីល្បាប់មាត់ទន្លេ សំបូរដោយប្រភព ទឹក
 ក្រោមដី ត្រសក់ស្រូវអាចលូត លាស់បានគេស្រោចទឹកតែ ៣-៤ថ្ងៃ ក្រោយពី
 ដាំតែប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់ពីត្រសក់ចេញផ្កា



ដែលបានដាក់មុនដាំ ឬដែល មានស្រាប់នៅក្នុងដីមានការវិវត្តន៍យឺតនិងកង្វះ ខាត ។ ដូច្នេះគេចែកចេញនូវការផ្តល់ជីចំនួន ៣លើកបន្ថែមទៀតគឺ:

- ការបំប៉នលើកទី១ ក្រោយពីគ្រួសក់មានសន្លឹក ២-៣សន្លឹក ១០-១៥ ថ្ងៃក្រោយដាំ ពេលនោះវាត្រូវការសារធាតុឯកទៀត ដូចនេះគេត្រូវយកជីអ៊ុយរ៉េ ទៅលាយទឹកស្រោច ក្នុងកំរិត ៣៥គក្រាម (៣០-៣៥ក្រាម លាយទឹក២០ លីត្រ) ស្រោចតាមគុម្ពឱ្យជោគ ។

- ការបំប៉នលើកទី ២ ច្រើនតែធ្វើឡើងក្នុងវគ្គជ្រុំជ្រួយដី (១៨-២០ថ្ងៃ ក្រោយដាំ) ដោយយកជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១០០-១២០ គ.ក្រ សំរាប់ផ្ទៃដី ១ ហិ.ត ដោយរោយដីជុំវិញគល់ហើយពូនដីលុប ឬពូនគល់ហើយយកជីទៅ កាប់ដាក់ក្បែរគល់ក៏បាន ក្រោយពេលដាក់ដី ហើយត្រូវស្រោចទឹកជុំវិញគល់ ឱ្យសើម ដើម្បីឱ្យជីរលាយបានលឿន

- ការបំប៉នដីលើកទី ៣ ការបំប៉នដីលើកនេះ គេចែកចេញជា ២វិធីសា ស្ត្រទៅ តាមគោលបំណងនៃផលិតកម្ម ដូចជា:

- ការផលិតជាបន្លែ: គឺប្រមូលយកផ្លែខ្លី ក្រោយពីប្រមូលផ្លែខ្លីបាន ២-៣លើក គេត្រូវយកជីអ៊ុយរ៉េទៅរោយជុំវិញគល់ហើយស្រោច ទឹកឱ្យជោគក្នុង ១ ហិ.ត ចំនួន ៥០-៧០ គ.ក្រ ។
- ការផលិតជាផ្លែទុំ: ត្រូវយកជីអ៊ុយរ៉េចំនួន ៤០ គ.ក្រ លាយនឹងដី ប៉ូតាស្យូម

ការជ្រុំជ្រួយដីមានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ គឺធ្វើឱ្យដីធូរឡើងវិញ ព្រមទាំង បន្ថយការដុះស្មៅ ធ្វើឱ្យមានបន្ទុកខ្យល់ផ្លាស់ប្តូរបានល្អ ។ ក្នុងករណីចំការ មានស្មៅ ច្រើនគេត្រូវជំរះយកស្មៅចេញឱ្យស្អាតជាមុនសិនហើយ ជ្រុំជ្រួយដី ពូនគល់តាម ក្រោយរបៀបជ្រុំ គឺជ្រុំឱ្យផុសពេញចំការ ប៉ុន្តែការពូនឱ្យត្រូវគល់ ព្រមទាំងថ្នាំ ចំនួន ២-៣ថ្នាំ ធ្វើឡើងក្រោយពីគ្រួសក់ពន្លត់ទងបាន ៥-៦ ថ្នាំ អាយុកាលពី ១៨-២០ថ្ងៃក្រោយដាំ ។

៦- ការប្រើប្រាស់ជី

ការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែម មានសារៈសំខាន់បំផុត ព្រោះសារធាតុ ចិញ្ចឹម



វិធានការការពារជំងឺ គេត្រូវជ្រើសរើសរដូវ ប្រើពូជធន់ ប្តូរមុខដំណាំអនាម័យចំការ សំអាតគ្រាប់ពូជជាមុន គ្រាប់ពូជលាយជាមួយថ្នាំមុនដាំក្រោយពីដុះ ពន្លកត្រូវយកលូលុយស្យុងថ្នាំផ្សិតទៅបាញ់ការពារនិង ជាពិសេសពេលលេចចេញសញ្ញា ដំបូងត្រូវទប់ស្កាត់ជាមុន បន្ថយការស្រោចទឹក និងការដាក់ដីអាសូត ។

២- ក្រុមជំងឺបង្កឡើងដោយវីរុស

មានវីរុសជាច្រើនប្រភេទតែងតែបំផ្លាញដំណាំអំបូរត្រសក់ប៉ុន្តែត្រសក់ស្រូវធន់ទ្រាំជាងគេ ។ នៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញជំងឺវីរុសមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានចម្លង ដោយសារពពួកចៃ ធ្វើឱ្យស្លឹកត្រសក់រុញខ្លួន បន្ថយការលូតលាស់ ក្នុងករណីផ្លែទុំធ្វើឱ្យ បាត់បង់រសជាតិ ។ គេអាចដឹងមុនបាននូវវត្តមានរបស់សត្វចៃដោយសារតែក្រុម ស្រមោចតោងឡើងដើមត្រសក់ពេលនោះ ត្រូវមានវិធានការទប់ទល់ ជាមុនកាលណាលេចចេញនូវសញ្ញារូញ ហើយត្រូវតែដកដើមចេញពី ចំការនូវដើមដែលរុញដោយពុំមានថ្នាំព្យាបាលមេរោគនេះឡើយ ។



ចំនួន ៥០ - ៦០គក្រ លាយបញ្ចូលគ្នាហើយកប់ក្បែរៗគុម្ព ក្រោយពីត្រសក់ចេញផ្កា បាន ២០ - ២៥ថ្ងៃ ។

III. អំពីជំងឺ និងវិធានការការពារ

ត្រសក់ស្រូវត្រូវបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណាំធន់ទ្រាំ នឹងជំងឺប៉ុន្តែនៅតែមាន ជំងឺមួយចំនួនដែលអាចបំផ្លាញដំណាំបានគឺ:

១- ក្រុមបង្កជំងឺដោយមេរោគផ្សិត

មានជំងឺផ្សិត៣ប្រភេទដែលបំផ្លាញត្រសក់ស្រូវជាញឹកញាប់ជាងគេដូចជា:

- ជំងឺរលួយកូន: ធ្វើឱ្យកូនត្រសក់ខ្លីៗទើបនឹង ដុះរហូតដល់អាយុ ១៥ ថ្ងៃក្រោយ ដាំតែងតែស្ងួតគល់ហើយរលួយ។
- ជំងឺស្លឹកស្លឹកពណ៌ត្នោត: ធ្វើឱ្យស្លឹកស្លឹកផ្ទាំងៗដុំៗធំ បន្ទាប់មករីករាលដាល ពេញលើផ្ទៃស្លឹកជាពិសេសលេចចេញពី ស្លឹកចាស់ៗមុនគេ រហូតដល់ធ្វើឱ្យផ្លែត្រសក់ ស្រឡាកខ្លោចសំបកដូចដំបៅ វាគ្រោះថ្នាក់សំរាប់ការផលិតជាផ្លែទុំ ។
- ជំងឺផ្សិតម្សៅលើស្លឹក: ដំបូងវាលេចចេញកំណកម្សៅជាកញ្ចុំៗលើផ្ទៃស្លឹកបន្ទាប់មកចំណុចនេះរីករាលដាលធំឡើងៗ និង ច្រើនឡើងៗជាពិសេសនៅរដូវត្រជាក់ ស្ងួត (រដូវរំហើយ) ក្រោយមកស្លឹកត្រសក់ទៅជាពណ៌ប្រផេះហើយម្សៅស្រអាប់ហុយពេលមានខ្យល់បក់ធ្វើឱ្យស្លឹកស្ងួតនិងជ្រុះ។

- មមាចជញ្ជក់ស្លឹក
- រុយស
- មមង់ជញ្ជក់ស្លឹក

វាច្រើនតែជញ្ជក់យករុក្ខសធ្វើឱ្យស្លឹកស្ងួត បន្ថយការលូតលាស់ ហើយបង្កឱ្យកើតជំងឺ។ វិធានការការពារ នឹងកំចាត់គឺប្រើពូជជន់និងគ្រប់គ្រងវត្តមានរបស់វាមុនពេលលេចចេញនូវទ្រង់ទ្រាយទៅតាមគ្រោះថ្នាក់ ទៅតាមវិធីសាស្ត្រដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

២- សត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញផ្លាស់

នៅក្នុងក្រុមនេះមានសត្វល្អិតខ្លះជាដង្កូវ ខ្លះទៀតជាខ្នងស្លាបរឹងតែងតែករករ កាត់ និងចោះស៊ីបំផ្លាញ ដូចជា:

- អណ្តើកមាសពណ៌លឿង: វាស៊ីស្លឹកកូទីឡេដុង ស៊ីត្រូយ ស៊ីផ្កា ក្តីបខ្លីៗធ្វើឱ្យ ត្រសក់ក្រិនលូតលាស់យឺត ច្រើនចេញបំផ្លាញពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច ពេលថ្ងៃ ជ្រក ក្រោមស្លឹក ។
- ដង្កូវបៃតងមូស្លឹក: តែងបំផ្លាញត្រួយខ្លីៗ និងផ្កាទើបនិងរីកលើ ដំណាំអំបូរត្រសក់ទាំងអស់ ហើយពេលថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងស្បែរមូរុនឹងត្រួយ វាមានពណ៌ដូចត្រួយ ត្រសក់។
- ដង្កូវចោះផ្លែ: វាតែងតែចោះស៊ីក្តីបខ្លីៗ ហើយរូងចូលទៅក្នុងផ្លែត្រសក់ធ្វើ

៣- ក្រុមជំងឺបង្កដោយបាក់តេរី

មានបាក់តេរី ២ប្រភេទដែលធ្វើឱ្យត្រសក់ស្រូវខូចខាតគឺ:

- បាក់តេរីធ្វើឱ្យស្រពោនស្លឹក តែងតែបង្កដោយមេរោគ ។វាតែងធ្វើឱ្យ ត្រសក់ស្រូវងាប់ក្នុងវគ្គចេញផ្លែ វាឆ្លងបានដោយរហ័សតាមរយៈទឹក ដី និង សត្វល្អិត ឈ្មោះថា ខ្នងត្រសក់ ។
- បាក់តេរីធ្វើឱ្យរលួយផ្លែ ដែលបណ្តាលឱ្យរលួយពេល ត្រសក់ផ្លែចាស់មិនទាន់ ទុំ គឺជាសំបកដុំៗ ហើយសាច់ខាងក្នុងរលួយជាស្រទាប់ៗ។ ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺនេះ គេត្រូវជ្រើសរើសពូជឱ្យបានល្អ ប្តូរមុខដំណាំពន្យារពេលដាំឱ្យច្រើនរដូវដុតដីសំរាប់ បណ្តុះកូនឱ្យងាប់មេរោគ សំអាតឧបករណ៍បណ្តុះទប់ស្កាត់ ។

IV. សត្វល្អិតចង្រៃ និងវិធានការការពារ

សត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទដែលតែងស៊ីបំផ្លាញ និងចម្លងជំងឺផ្សេងៗក្នុងនោះមាន:

១- សត្វល្អិតជាត្នាក់ងារចម្លងរោគ

មានសត្វល្អិតជាត្នាក់ងារបង្ករោគជាច្រើនប្រភេទ ដែលតែងតែបំផ្លាញហើយបន្សល់ទុកនូវជំងឺ ជាពិសេសជំងឺ វីរុសដូចជា ៖

- ចៃខ្មៅ
- ចៃបៃតង

ត្រសក់ស្រូវអាចប្រមូលផលបាន (បន្លែ) ក្រោយពីដាំបានរយៈពេល ៤៥-៥០ ថ្ងៃ ក្រោយដាំ ជាលើកដំបូង គេប្រមូលយកផ្លែខ្លីៗសំរាប់ធ្វើជាបន្លែស្រស់ ឬ ជ្រក់នៅតំបន់ ខ្លះក្នុងខេត្តកំពង់ចាម គេយកទៅធ្វើជាត្រសក់គ្រៀម ឬត្រសក់ ចាវ ។ ការប្រមូលផល ធ្វើឡើង ៣-៤ថ្ងៃម្តងៗ ហើយធ្វើឡើងជាច្រើនដង ក្នុង មួយវគ្គជីវិតរបស់វា ទិន្នផល ជាមធ្យមគឺ ៨-១១តោន នៅក្នុងតំបន់មាត់ទន្លេ ...។ របៀបប្រមូលផលគឺគេប្រើ កន្ត្រែកាត់យកផ្លែ ដើម្បីរក្សាទុកផ្លែបានយូរ ក្រោយពីកាត់ហើយ យកមករក្សាទុក នៅក្នុងម្លប់ភ្លាម និងរៀបចូលទៅក្នុង កន្លែងស្ងួតមិនឱ្យរលូតសំបកឡើយ ព្រោះសំបកវាស្លើង កាលណាប៉ះទង្គិច ខ្លាំងបាត់បង់នូវសោភ័ណភាពទីផ្សារ ។

ចំពោះការប្រមូលផលផ្លែទុំ គេត្រូវទុកត្រសក់ឱ្យទុំពេញលក្ខណៈ រហូតដល់ រយៈពេលខ្លួនវា ។ នៅក្នុងចំការគេអាចដឹងត្រសក់ទុំបានដោយសារ រសក្លិនក្រអូបរបស់ វាតែមិនលើសពី ៦៥-៧០ថ្ងៃក្រោយដាំ គេត្រូវរើសយកផ្លែ ទុំមកទុកដាក់កន្លែង



ឱ្យផ្លែស្អុយ ដង្កូវប្រភេទនេះបំផ្លាញដំណាំយកផ្លែស្ទើរតែទាំងអស់ ។

- រុយទិចផ្លែខ្លីៗ ដំណាំអំបូរត្រសក់ធ្វើឱ្យក្តិបស្អុយៈ លែងលូតលាស់ ដោយ ឮបញ្ចូលពងរបស់វាទៅភ្ជាស់នៅក្នុងផ្លែនោះ ។

ដើម្បីទប់ស្កាត់នូវកត្តាចង្រៃប្រភេទនេះ គេមានវិធានការជាច្រើនដូចជា ដាំដំណាំចំរុះយកត្រសក់ស្រូវដាំជា មួយថ្នាំជក់ ជាមួយពោត ជាមួយនឹង ប៉េងប៉ោះ សំអាតចំការឱ្យបានស្អាត ជ្រើសរើសពូជឱ្យសមស្រប និងផ្តល់ ទឹក ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងសត្វទាំង នេះមុនពេលលេចចេញជាមេចំណាស់ ប្រសិទ្ធភាពល្អគឺកំចាត់វាក្នុងដំណាក់កាលជាកូនដង្កូវ ទៅតាមវិធីសាស្ត្រដែល អាចធ្វើទៅបាន ។

V. ការប្រមូលផល

