

ការដាំខាត់ណាដើមខុសរដូវ

Chinese Kale off Season

I. ការជ្រើសរើសពូជ

ពូជខាត់ណាដាំចូលពីប្រទេសជិតខាង (ដំណាំនេះមិនទាន់ផលិតពូជបាននៅកម្ពុជា) ក្នុងនោះមាន :



- ពូជផលិតដោយក្រុមហ៊ុន ជាតៃ មានរូបសញ្ញាយន្តហោះ ពូជនេះដើមធំ វែង ស្លឹកក្រាសរួញ ទំហំស្លឹកតូចមធ្យម ។ លក្ខណៈនៃការលូតលាស់ធននឹងរដូវក្តៅជាងពូជនានា ហើយពេញនិយមលើទីផ្សារ ។
- ពូជផលិតដោយក្រុមហ៊ុន ពីតូ មានរូបសញ្ញារថក្រោះជាប់នឹងកញ្ចប់ ឬកំប៉ុង ពូជជាតៃ ពូជនេះដើមធំខ្លី ស្លឹកញឹកហើយធំ មូលរួញបន្តិចៗ ហើយស្តើង វាលូតលាស់នៅរដូវត្រជាក់ល្អ ប៉ុន្តែនៅរដូវក្តៅ ច្រើនប្រេះដើម ពេញនិយម

លើទីផ្សារបង្ករ ។

- ពូជផលិតដោយក្រុមហ៊ុន អេស្តេវេស៊ីដ មានសញ្ញារូបយុទ្ធជា ពូជនេះមានដើមតូច ខ្លីស្លឹក ដំបូលរលោង ទងស្លឹកតូចៗ ការលូតលាស់ក្នុងតំបន់អាកាសធាតុក្តៅ ឬរដូវក្តៅមិនសមប្រកបឡើយ ។

II. វិធីសាស្ត្រសាបកូនខាត់ណា

នៅរដូវក្តៅការផលិតកូនខាត់ណាជួបការលំបាកពីរយ៉ាងគឺភាពរលួយ និងសត្វល្អិតបំផ្លាញដើម្បីផលិតកូនខាត់ណាអោយជោគជ័យ យើងមានវិធីសាស្ត្រដូចតទៅ:

១. ការរៀបចំផ្ទាល់សាប



ត្រូវជ្រើសរើសយកដីដែលទួល មានជីជាតិល្អ វាលស្រឡះ រដូវមុនមិនដាំអប្បវស្តែ(ស្ពៃ ខាត់ណា) ។ ត្រូវភ្ជួរហាលដីអោយបានច្រើនដង ប្រមូលយកស្មៅចេញអោយស្អាត ហាលដីអោយស្ងួត បន្ទាប់មកលើករងដោយទទឹងរងនិមួយៗ ប្រវែង ១ម បណ្តោយ ១០-១៥ម។ យកជីលាមកគោ ឬ ជីកុំប៉ូស្តចំនួន ៣-៤បង្កី កំបោសទំងន់ ០.៥ kg ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតប្រភេទហ្វូយវ៉ាដង់ ទំងន់ ៣០០ g មកបាចពង្រាយពិលើរង ហើយពូនដីរងអោយខ្ពស់ ដូចរងដាំដំឡូង រួចស្រោចទឹកអោយជោគទើបគ្របកៅស៊ូពាសពិលើរងសង្កត់តែមកៅស៊ូអោយជាប់ដី ទុកចោលរយៈពេល ៧ថ្ងៃ ។ ធ្វើបែបនេះដើម្បីអោយដី

រងនោះមានកំដៅក្តៅខ្លាំង សំលាប់នូវពួកសត្វល្អិត ព្រមទាំងពួកមេរោគមួយចំនួននៅក្នុងដី ។

២. ការសាបគ្រាប់ពូជខាត់ណា



មុននឹងសាបគ្រាប់ពូជកៅស៊ូគ្របដីនោះចេញ ហើយកាយដីពង្រាបរងអោយស្មើ គ្រូវដីលើផ្ទៃរងអោយស្មើល្អ វាយដីអោយស្អិត បង្កាប់តែមរង រួចយកគ្រាប់ពូជខាត់ណាទំងន់ ៣០ g (៣ស្លាបព្រាបាយ) មកសាបអោយស្មើ ក្រោយមកបាចកំណាត់ចំបើងខ្លីៗ អោយបានកំរិត ៦០%(មើលឃើញដីខ្លះៗ) ស្រោចទឹកអោយជោគ យកថ្នាំការធូតប្រភេទម៉ង់កូសែបលាយ

ទឹកស្រោចតាមក្រោយ ។ បន្ទាប់ពីសាបហើយត្រូវដោតបន្ទះឬស្សីធ្វើតំបូលបង្កង រួចយកសំណាញ់ពណ៌បៃតងក្រឡា ញឹកមកគ្រប់ប្រកពីលើអោយជិត សង្កត់ជើងសំណាញ់អោយជាប់ទៅនឹងដី។ ករណីមានភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវគ្របកៅស៊ូការពារ ភ្លៀង ហើយបើកចំហវិញក្រោយអស់ភ្លៀងសំណាញ់ការពារសត្វល្អិត ។

៣. របៀបចែងវិក្កនខាត់ណា

ការស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រឹក ល្ងាច អោយសើមល្មម ពេលស្មៅដុះត្រូវលូកដៃទៅក្នុងដំបូលសំណាញ់ ដក យកស្មៅដោយមិនបើកសំណាញ់ឡើយ ។ ពេលកូនខាត់ណាមានសន្លឹកចំនួន ៣-៤ សន្លឹកត្រូវដករំលោះចេញកន្លែងដុះញឹក ឬក្រាស់ បន្ទាប់មកយកដឹកប៉ុស្តិ៍ទឹកមកលាយជាមួយដីអ៊ុយរ៉េបន្តិចៗ ស្រោចបំប៉នកូនអោយឆាប់លូតលាស់ ។ ក្រោយពី សាបរយៈពេល ២០-២៥ថ្ងៃ អាចមកយកកូនខាត់ណាទៅស្ទូងលើដីថ្នាលបាន ។

III. វិធីសាស្ត្រស្ទូងខាត់ណាដើម

ភាគច្រើនកសិករខ្លះតែងអនុវត្តន៍ការដាំដុះខាត់ណាដើមដោយសាបគ្រាប់ពូជផ្ទាល់ទៅលើរងផ្ទាល់បន្ទាប់មកដក រំលោះកូនទុកអោយរង្វើល ធ្វើរបៀបនេះរងការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតច្រើនហើយចំណាយលើការថែទាំច្រើន ចំពោះ នៅរដូវក្តៅ ការអនុវត្តបែបនេះពុំបានទទួលផលច្រើនឡើយ ។

១. ការរៀបចំផ្ទាល់សំណប់ស្ទូង

ក្រោយពីសាបគ្រាប់ពូជខាត់ណាហើយ គេត្រូវភ្ជួរដីសំរាប់ដាំ ហាលទុកជាមុន ។ បន្ទាប់ពីការភ្ជួររាស់លើកទី២ ត្រូវប្រមូលយកស្មៅចេញ លើករងអោយបានខ្ពស់កំពស់រងពី ២០-៣០ស.ម (រដូវវស្សា)ទទឹងរង ១,០ម ប្រវែងរង ១០- ១៥ម ក្រោយមកយកដឹកប៉ុស្តិ៍ ឬ ដីលាមតសត្វចំនួន ៤-៥បង្កី ដី១៥-៥-១៥ ទំនង ៣០០-៣៥០ g (៣ខាំ-៣ខាំកន្លះ) មកបាចលើរងអោយស្មើល្អជ្រុំបង្កប់ដីទៅក្នុងដី បាចកំណាត់ចំបើងខ្លីៗ ពេញលើរងដើម្បីការពារសំណើម និងសម្អាត គ្រាប់ភ្លៀងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ ។

២. របៀបស្ទូងកូនខាត់ណា

មុននឹងដកកូនខាត់ណាត្រូវស្រោចទឹកលើរងអោយជោគរយៈពេលកន្លះម៉ោង ហើយដកជ្រើសរើសយកកូនធំៗ ថ្លោសស្មើគ្នាដាក់កញ្ចែងស្រោចទឹកអោយសើមៗ រក្សាទុកក្រោមម្លប់ពីពេលព្រឹកជាមុន ។ ចំពោះផ្ទាល់ដែលត្រូវស្ទូង ត្រូវ ស្រោចទឹកអោយជោគ ទើបយកកូនខាត់ណាទៅស្ទូងតាមចន្លោះចំបើង ដោយប្រើចន្លោះគុម្ព និងជួរ ១៥សម-១៥សម មួយគុម្ពមួយដើមក្នុងជំរៅ ២-៣សម ក្រោយស្ទូងហើយស្រោចទឹកអោយជោគភ្លាម ការស្ទូងច្រើនធ្វើឡើងពេលល្ងាច ។

IV. ការថែទាំខាត់ណាដើម

ខាត់ណាដើមជាដំណាំមានវត្តជីវិតខ្លី ដូចនេះការថែទាំត្រូវចែកដំណាក់ការអោយច្បាស់លាស់ក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ការស្រោចទឹក

ស្រោចទឹកជាប្រចាំព្រឹកល្ងាច ក្រោយស្ទូងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ករណីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងត្រូវស្រោចទឹកមួយថ្ងៃ ៣ដង គឺព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច ។ ក្រោយមកទៀតស្រោចតែពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ នៅរដូវភ្លៀងពេលយប់មានភ្លៀងធ្លាក់ ព្រលឹមឡើងត្រូវស្រោចទឹកលាង ព្រោះទឹកភ្លៀងបណ្តាលអោយរលួយ ។

២. ការដកស្មៅ ឬដីជ្រោយដី

គេត្រូវដកស្មៅចេញពីថ្នាលខាត់ណា ពេលដែលដុះស្មៅច្រើន ក្រោយពីស្ទូងប្រមាណ ១៥ថ្ងៃ លើកទី១ និង ៣៥ ថ្ងៃក្រោយស្ទូងលើកទី២ ។ នៅពេលដកស្មៅម្តងៗ ត្រូវយកកូនចបដៃមុខតូចមកដឹកដក ហើយជ្រុំដីបន្តិចៗ ចន្លោះជួរ ខាត់ណាហើយពង្រាយចំបើងគ្របទៅវិញ ។

៣. ការដាក់ជីបំប៉ន

ក្រោយពីស្ទូងហើយរយៈពេល ៧ថ្ងៃ កូនខាត់ណាលែងស្រពោន គេត្រូវយកជីកុំប៉ូស្តទឹកប្រមាណ ១,៥ លីត្រ លាយជីអ៊ុយរ៉េន្នូន ២ស្លាម ព្រាបាយលាយទឹកពី ១៥-១៨លីត្រស្រោចអោយជោកមួយរងស្មើ និងមួយអំរែកទឹក ។ ក្រោយមកបន្ទាប់ពីដកស្មៅលើកទី១ ក្នុងករណីដីតដួ ឬល្បាយខ្សាច់ខ្លះដីជាតិ គេត្រូវបាចជីកុំប៉ូស្ត ឬជីលាមកសត្វពុកៗ មួយរង ២បង្កើនម្តងទៀតរួមជាមួយជីអ៊ុយរ៉េ ៥០g (កន្លះខាំ) លាយគ្នានឹងជី ១៥-១៥-១៥ ១០០g (មួយខាំ) ។

របៀបប្រើបាចជីគឺមីពីរប្រភេទនេះហើយ ទើបបាចជីកុំប៉ូស្ត ឬជីលាមកសត្វតាមក្រោយតាមចន្លោះជួរ ហើយ ស្រោចទឹកអោយជោកខ្លាំង ។ ការស្រោចជីបំប៉នលើកក្រោយៗ គឺធ្វើឡើងរយៈពេល៧ថ្ងៃម្តង ។ រហូតដល់ពេល ប្រមូលផល ប្រភេទជីកុំប៉ូស្តទឹក និងជីអ៊ុយរ៉េ ។

V. ជំងឺសត្វល្អិត និងវិធានការគ្រប់គ្រង

ការដាំដុះខាត់ណាដើមរដូវវស្សាកត្តាចម្រែងដែលបណ្តាលមកពីសត្វល្អិតមានកំរិតទាបប៉ុន្តែជំងឺដែលបណ្តាលអោយ ខាត់ណារលួយ និងអុចស្លឹកកើតមានច្រើនក្នុងនោះមាន ៖

១. ជំងឺសំខាន់ៗកើតនៅរដូវភ្លៀង

- នៅរដូវក្តៅ ដីសើមខ្លាំង ភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ធ្វើអោយកើតជំងឺ ៣ប្រភេទគឺ៖
 - ជំងឺអុចរលៀកស្លឹកដំបូងសង្កេតឃើញគល់កូនខាត់ណាមានស្នាមប្រជ្រុយពណ៌ត្នោតក្រោយមកប្រជ្រុយនោះ រីករាលឡើងមកលើដល់ធាងស្លឹក និងស្លឹកធ្វើអោយត្រួយខ្លីៗ រលៀកហើយរលួយហៅថាជំងឺប្រជ្រុយត្នោត (Bacterial Spotted)
 - ជំងឺប្រេះដើមរលួយធាង ជំងឺនេះច្រើនតែកើតនៅក្នុងវគ្គកូនខាត់ណាពង្រីកដើមក្រោយស្ទូងបាន២៥ថ្ងៃឡើង ទៅ មេរោគបានធ្វើអោយដើមខាត់ណាប្រេះតាមបណ្តោយដើម ហើយធ្វើអោយរលួយ ជាពិសេសនៅពេលមានភ្លៀង

ធ្លាក់ខ្លាំង អាកាសធាតុក្តៅ គេអោយឈ្មោះថាជំងឺរលៀកបណ្តូល ព្រោះវាធ្វើអោយបណ្តូលសាច់ខ្លឹក្នុងដើមរលួយ ជាប្រភេទជំងឺ (Soft Rot) **ជំងឺផ្សិតរលួយកូន** ។

- ជំងឺរលួយ និងពកបួស ជំងឺនេះច្រើនតែកើតលើប្រភេទដីក្នុងដីខ្លាំងហើយខ្សោះជីជាតិ ដីនោះជ្រាបទឹកមិនល្អស្ងួតលើតែសើមក្រោមវាកើតគ្រប់រដូវ ប៉ុន្តែរដូវភ្លៀងធ្វើអោយបាត់បង់ទិន្នផលច្រើនជាប្រភេទជំងឺផ្សិតឈ្មោះ (Fusarium Wilt)
- វិធានការគ្រប់គ្រង និងការពារនៅពេលលេចចេញនូវសញ្ញាជំងឺទាំងពាខាងលើយើងត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹក និងជីបំប៉ន ប្រមូលយកស្លឹកក្រោមៗចេញ ដកដើមដែលកើតជំងឺចេញពីថ្នាលខាត់ណាយកទៅដុតចោល ហើយថ្នាំការពារជំងឺផ្សិតនឹងបាក់តេរីឈ្មោះ ខុបភីហាយដុកលាយ ឬមេណូមីលមកលាយទឹកបាញ់អោយជោគ រយៈពេល ៧ថ្ងៃម្តងៗ កំរិតប្រើ ៣ស្លាបព្រាបាយលាយទឹក ១៥លីត្រ ។



ជំងឺរលៀកដើម, ស្លឹក

២. សត្វល្អិតចង្រៃសំខាន់ៗ

ក្នុងចំណោមសត្វល្អិតជាច្រើន ការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរនៅរដូវនេះមានតែពាប្រភេទប៉ុណ្ណោះរួមមាន៖

- **សត្វទាតូមេខ្មៅ** វាជាប្រភេទសត្វល្អិតមានស្លាបតូចពណ៌ត្នោតខ្មៅ ស្លាបមានពណ៌ផ្កាត្នោតលឿង វាបំផ្លាញលក្ខណៈជាហ្នួងៗគឺស៊ីទំលុះស្លឹក ធ្វើអោយក្រិនស្លឹក បន្ថយការលូតលាស់ ។ កូនពាស្រវល់របស់វាស៊ីបួសខាត់ណាក្នុងដី (Flea beetle leaf) ដើម្បីការពារសត្វប្រភេទនេះ គេបាំងសំណាញ់ញឹកព្រឹកព្រឹកអោយមានកំពស់ ២ម វាមិនអាចលោតចូលបានឡើយ ហើយថ្នាំសំរាប់កំចាត់វា ប្រើប្រភេទអាបាមីតទីនលេខ ៥០ ចំនួន ៣០សេសេ លាយនឹងម្សៅកាបារីល ២ស្លាបព្រាបាយទឹក ១៥-១៨លីត្របាញ់ចន្លោះម៉ោង ៨ ទៅម៉ោង ១០ ព្រឹក និងម៉ោង ៣-៤ ល្ងាចជាពេលដែលវាចេញបំផ្លាញដំណាំ ។
- **ដង្កូវហ្លួងកាត់ស្លឹក-ដើម** ក្រោយពីពិនិត្យឃើញមានកូនដង្កូវទើបញ្ជាស់ចេញពីសំបុកក្រោមស្លឹក ត្រូវក្តិតស្លឹកថ្មមៗ ដាក់ក្នុងធុងទឹកមានលាយប្រេងម៉ាស៊ីន ហើយយកទៅចាក់ចោលក្រៅចំការ។ បន្ទប់មកបាញ់ថ្នាំកំចាត់បន្ថែម គឺប្រភេទថ្នាំឈ្មោះ មេទីលផូសស្វាតលេខ ៥០ កំរិតប្រើ ៣៥-៤០ c.c លាយទឹក ១៨ លីត្រ បាញ់ពេលព្រឹកព្រលឹម ឬពេលល្ងាច ។



- **ដង្កូវស៊ីរូងកំពូលខាត់ណាដង្កូវប្រភេទនេះ** ច្រើនតែញាស់ចេញពីពងមេអំបៅដែលពងដាក់ចំណុចត្រួយ នៅពេលវាញាស់ភ្លាមវាបង្កើតស្បែកខ្លាំងៗរំពៃកំពូលខាត់ណាការពារខ្លួនវាហើយវាក៏ស៊ីចូលនៅក្នុងកំពូលបណ្តូល នៃខាត់ណាធ្វើអោយខាត់ណាលែងលូតលាស់បន្តទៅទៀតបាន ។ នៅពេលមានដង្កូវនេះស៊ី

គេប្រើថ្នាំប្រភេទប៊ីយូស៊ីន ឬផ្លូបាក់ របៀបប្រើគីទឹកមួយចុង១៨ លីត្រ លាយ ថ្នាំនេះ ពាកញ្ចប់ មួយកញ្ចប់ ១០ c.c បាញ់ពេលល្ងាចត្រជាក់ ។

VI. ការប្រមូលផល

ក្រោយពីស្ទង់បានរយៈពេល៤០-៤៥ថ្ងៃ ខាត់ណាមានដើមរីកប៉ោងធំស្លឹកខាងចុងនៃកំពូលតូចខ្លីៗ ហើយញឹកចុង បំផុតនៃទ្រុយលេចចេញសញ្ញាណនៃផ្កាតូចៗ គេអាចសំគាល់បានថាវត្តជីវិតរបស់ ខាត់ណាបញ្ឈប់ត្រូវប្រមូលផលបាន ។ មុនពេលប្រមូលផលរយៈពេល ១០ថ្ងៃ បញ្ឈប់ការស្រោចដី និង បាញ់ថ្នាំពុលផ្សេងៗ ។



របៀបប្រមូលផលត្រូវយកកាំបិតបុតគល់ខាត់ណាក្បែរៗដី ក្រោយពីស្លឹកខាត់ណាស្ងួត ទឹកចន្លោះម៉ោង ៨ ទៅម៉ោង ១០ព្រឹក ក្រោយពីកាត់ ហើយត្រូវជញ្ជូនដើមខាត់ណា ទៅដាក់ក្រោមម្លប់ត្រជាក់ ហើយទើបធ្វើការសំរាំងដោយ កាត់គល់អោយត្រឹម កាត់នាងខាត់ណាអោយស្មើដើមស្លឹកក្រោមៗ បន្ទប់មកតំរៀបដើមខាត់ណាដាក់ចូលក្នុង ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន ។ លទ្ធផលពិសោធន៍ បានបង្ហាញ នូវទិន្នផលជាមធ្យមពី ៣២-៣៦ តោនក្នុងមួយហិកតា ។