



ត្រូវយកដល់បីលើដី

៥- ស្រោចស្រព:

បើយើងដាំកូនម្ចាស់នៅរដូវប្រាំង យើងត្រូវស្រោចទឹកពន្លឺចរងក្រោយដាំរួច និងត្រូវស្រោចវារៀងរាល់១ខែម្តង រហូតដល់ភ្លៀងធ្លាក់ ។

៦- កាច់សំអាតខ្លះ:

ជាធម្មតាពូជម្ចាស់ ស្រុកយើងពុំសូវឃើញមានខ្លះកូននៅពេលដើមម្ចាស់ កំពុងលូលាស់ទេ ប៉ុន្តែយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យមើលបើឃើញមានខ្លះត្រូវកាច់ចេញ ដោយទុកតែដើមមេមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីអោយបានផ្លែធំ ។

៧- ខ្សែឆ្នាំង:

ដើមម្ចាស់ អាចចាក់ថ្នល្អយបានលុះ ត្រាតែវាមានដើមធំល្អដែលមានស្លឹកលើស ពី២០ឡើងទៅ ។ យកថ្នល្អយលេខ១ចំនួន ៣ខំលាយជាមួយ ទឹក១ធុងចំណុះ២០លីត្រ រួចយកទឹកល្អាយនេះចាក់ចូលក្នុងបណ្តូលដើមម្ចាស់ទាល់តែពេញ ។ ជាធម្មតាល្អាយទឹកថ្នល្អយ២០លីត្រ អាចចាក់បាន ៣រងប្រវែង២០ម៉ែត្រ ។ ក្រោយចាក់ថ្នល្អយរយៈពេល ៤

ខែ២០ ថ្ងៃទើបម្ចាស់ទុំអាចកាច់យកលក់បាន ។



ចាក់ល្អាយទឹកថ្នល្អយចូលទាល់តែពេញ

អាចរកទិញកូនម្ចាស់បានតាមរយៈ:

- ១- អ្នកស្រី **ងួន ង៉ាន់**, ស្រុក មោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង, ទូរស័ព្ទ: ០៩២ ១៥ ៨២ ៦៧
- ២- លោក **ប៊ុន ពា**, អ្នកដាំម្ចាស់ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប, ទូរស័ព្ទ: ០៩២ ១៧ ៥១ ៥៨
- ៣- លោក **មាស ស្តើង**, អ្នកដាំម្ចាស់ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប, ទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៨៧ ៤៧ ៣៩
- ៤- អ្នកស្រី **រឿន ហិត**, អ្នកដាំម្ចាស់ភ្នំគូលែន ខេត្តសៀមរាប, ទូរស័ព្ទ: ០៩៩ ៥២ ២៨ ៩៧

សំរេងសំរួលដោយ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប
 Facilitated by RED - Green Belt Siem Reap

ភាពជោគជ័យ នៃការដាំម្ចាស់



**ការណែនាំអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងជា
ជំហានៗដោយ:**

អ្នកស្រី **ងួន ង៉ាន់**, កសិករដាំម្ចាស់នៅឃុំព្រែកជីក, ស្រុក មោងឫស្សី, ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទ: ០៩២ ១៥ ៨២ ៦៧

ដំណាំម្ចាស់

១. ការរៀបចំដី:

យើងត្រូវរុករានដីអោយបានស្អាត ទុកចោល ១សប្តាហ៍ បន្ទាប់មកកាយចង្កូរ ឬភ្ជួរឆ្នុតដែល មាន- បណ្តោយ២០ម៉ែត្រ និងចន្លោះចង្កូរប្រវែង ១ម៉ែត្រ រួចដាក់ដីអាចម៍គោតាមចង្កូរហើយ លប់ដីពីលើ ។

២. ការដាំម្ចាស់

យើងដាំកូនម្ចាស់ពីលើចង្កូរដែលដាក់ដី អាចម៍គោ ដែលមានចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ ប្រវែងពី ៣ ទៅ ៤តិក និងចន្លោះរង ប្រវែង ពី៦ ទៅ ៨តិក ។ យើងត្រូវកប់គល់កូនម្ចាស់ចូលទៅក្នុង ដីប្រមាណ ១តិក ។



៣. ការសំអាតស្មៅ, ពូនគល់ និង ការគ្របដី:

ស្មៅចាប់ផ្តើមដុះក្រោយយើងដាំ រួចរយៈ ពេល១ខែ យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើល បើឃើញថា មានស្មៅដុះកំពស់កូនម្ចាស់ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការ ជំរះស្មៅចេញ រួចពូនរងនិងយកស្មៅងាប់ ឬ ដើម កន្ត្រាំងខែត្រ ឬអង្គុយដាក់ពីលើរងអោយបាន ច្រើនដើម្បីអោយកើតជាដី និងបន្ថយការលូត លាស់របស់ស្មៅ ។

៤. ការដាក់ដី:

- ◆ **ការដាក់ដីទ្រាប់បាត:** យើងដាក់ដីលាមក សត្វប្រមាណ៣ការុង ឬ៣០គីឡូក្រាមពី លើចង្កូររងប្រវែង២០ម៉ែត្ររួចកាប់ជ្រោយ អោយបានសព្វមុនពេលដាំ ។
- ◆ **ការដាក់ដីបំប៉ន:** យើងប្រើដីអ៊ុយរ៉េ២ដង និងដី២០-២០-១៥ ១ដងសំរាប់បំប៉នដើម ម្ចាស់អោយលូតលាស់ល្អ ។ ត្រូវសំអាតស្មៅ អោយបានស្អាតជាមុនសិន និងត្រូវដាក់ដី

ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ សំរាប់រដូវវស្សា ។ នៅរដូវ ប្រាំងយើងត្រូវយកដីអ៊ុយរ៉េចំនួន កន្លះគីឡូ ក្រាម លាយទឹក១ធុងចំណុះ២០លីត្រ សំរាប់ កូនម្ចាស់ ១០០ដើម ។ ត្រូវចាក់ស្រោច តាម គល់កុំអោយទឹកជីចូលក្នុងបណ្តូលដើមម្ចាស់ ។



- * **លើកទី១:** ត្រូវដាក់ដីក្នុងរយៈពេល១ ខែ កន្លះក្រោយដាំ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ១គក្រសំរាប់ កូនម្ចាស់ ២០០ ដើម ។
- * **លើកទី២:** ត្រូវដាក់ដីក្នុងរយៈពេល ២ខែ ក្រោយលើកទី១ ប្រើដីអ៊ុយរ៉េម្តងទៀត ១គក្រ សំរាប់កូនម្ចាស់ ២០០ ដើម ។
- * **លើកទី៣:** ពេលម្ចាស់ចាប់ផ្តើមចេញផ្កា ប្រើដី ២០-២០-១៥ ១គក្រ សំរាប់ កូន ម្ចាស់ ២០០ ដើម ។
- ◆ **ចំណាំ:** យើងអាចប្រើដីទឹកនោម ត្រាំជាមួយ លាមកសត្វ និងដើមកន្ត្រាំងខែត្រ ដោយចាក់ ស្រោចតាមគល់ជំនួសដីអ៊ុយរ៉េបាន ។ យើង ប្រើទឹកជី១ធុងចំណុះ២០លីត្រ សំរាប់ម្ចាស់ ១០០ដើម ។