

- ធនល់ការចេញផ្សាយ ធ្វើឲ្យជាប្រើន មិនទេ: ហើយ ការសែន្ទូល និង អោយលើងមាន រសជាតិដូម មួយ កំរិតឡៀត។ ត្រូវលាយដី ដែល ១០០cc ជាមួយ ទីក ២០L ដូចមុនបាតាច្ប័ំទ្វេស្សត្រូយ ដើម និង គល់លើងអោយ សីមជាត។
- រយៈពេល ២ខែកន្លែងទៅ ៣ខែលើងបាប់ដើម ចេញផ្សាយហើយ នៅពេលចេញផ្សាយ យើងភាគ កំណត់ថាដើមមួយឈាមានដែនដឹង ហើយដើម មួយឈាមានដែនខ្លី។ ហើយដើមឈាមានជាលើង រាងប្រជុំដូចកដុបយើងទុកវា យើងជាលើងមាន រាងមូលខ្លួន យើងការប់ដើមនោះចេញ នោះទីប លើងក្នុងចំការមានសុខទៅដែនដឹងទាំអស់។ ក្នុង មួយគុម្ភ យើងទុកទៅមួយដើមទេ។
- នៅពេលចេញកូប តែងតែមានត្រូយលើងដុះ ចេញ តាមធនាគ់នៃដើមលើង។ យើងត្រូវបែប: រាងចេញ ដើម្បីអោយដែនលើងវិកជំលូ និងដែ ត្រីន។



ផ្សាយដែនមូលខ្លួន



ផ្សាយដែនដឹង

៤- ការប្រឡាយដែន:

- រយៈពេលពី ៥-៦ ខែយើងអាចប្រមូលដល បាន ចំពោះតែលើងពួកដែនខ្លី។ ហើយដឹងបែប: ទី គីយ៉ែង ទុករយៈពេលពីខែទីបអាចបែប: ទី បាន។
- ពេលបែប: ដែនអស់ហើយយើងត្រូវបាតាច្ប័ំដីដើម មួងឡៀតក្នុងកំរិតប្រើ ១០០cc លាយជាមួយ ទីក ២០L បាតាច្ប័ំតែតែលើងទេ ហាមបាតាច្ប័ំលើ ផ្ទា និង ក្នុបដែលអាចបណ្តាលអោយរុះជាត និងដែនក្នុប។ មុនពេលបាតាច្ប័ំដីយើងត្រូវស្រាច ទីក អោយជាតតែលសិនទីបយើងបាតាច្ប័ំដី នេះតាមរក្សាយ។ ការបាតាច្ប័ំតី ក្រាយពេល ប្រមូលដល សំរាប់ដំនួយ ដល់ការចេញផ្សាយ ក្នុប និងអោយដែនដែនមូលខ្លួនឡើត។

ឯកសារពិន្ទេរោះ:


- Traing module on fruit tree production, 2013
(គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ដំណោះស្រាយបែបដែន នៅខេត្ត កំបន់ពាយពុ)
- បទពិសោធន៍ ជូប វិចិត្រ កសិករជាតិលើង, 2012
(យុគត៊គ្រ ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង)



ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងសោរជាតិ និងក្រសួងសោរជាតិ
នាយកដ្ឋានជូបរាយកសិកម្ម

បទពិសោធន៍បោគល់

គុណភាពជាប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រង



សមាគារជិតបោយ៖


នាយកដ្ឋានជូបរាយកសិកម្ម និងក្រសួងសោរជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍សេវាឌីប្រើប្រាស់ ខេត្តសោរជាតិ
ឆ្នាំ២០១៣

ජයග්‍රහණ ප්‍රතිපාදන සංඛ්‍යා මුද්‍රා



៩. ភាពព្រឹងចំណើនាំខ្លួន

- * យើងត្រូវក្នុរបាលដីទុកពេលចំនួន ១ខែទៅ១ខែ កន្លែងសិន ដើម្បីអាយងារប់សត្វលូតនឹងស្មោះ លូយបានល្អ។ យើងត្រូវក្នុរដីមួយលីកទៀត នៅពេលដែលជីតជាំកូនល្អ។
 - * យើងត្រូវទាញខ្សោយត្រង់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជាំដំណាំរួចទៀត ក្រោមដីមល្អ។
 - * ចន្ទារៈពីដីមមួយទៅដីមមួយទៀត ប្រវែង ៣ ថ្ងៃត្រា។
 - * យើងត្រូវធ្វើតបដោលចំណាំរណែរដែលយើងវាស្សីចហើយ យកជីវិត ចំនួន៥០០cc លាយទីក ២០២ មកបានឲ្យធ្វើជាតិ ចំបង្កាលរណែទាំងបំផុត ៤ដុង រួចទុករយៈពេល ពេចចេច ទីបយើងការប់រណែ។ មុនបានឲ្យជីត្រូវប្រាថាចទីកចំកន្លែងរណែអាយជាតសិន ទីបានឲ្យជី



នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងជានល់
រាជធានីភ្នំពេញសំបុរាណីជាតិ និងសត្វជនទាំងអស់

៤. ភាពជំនួយខ្លួន

- ✿ កាប់រណ្តីដែលយើងត្រូវបានជើរហើយ ទាំងប៉ា
តិក ជំរោចតិក កាប់បំផុសដីឡូម៉ែត់ ដោយលាយ
ជាមួយជីអាចម៉ោតុកល្អ។
 - ✿ ក្នុងលុងអាយុពី១ខែកន្លែង៖ ឡើង ខែមានប្រវែង
មួយចុង្ញាមដែល យើងត្រូវត្រូវបានប្រើបានជាតិ
មុនយកឡើដំ។
 - ✿ យកចំង់ចេញ ដោយកុអោយបែកអាចម៉ែនី និង
ជាច់បុសលូងបណ្តាលឡើក្នុងលុងហាប់បាន។
 - ✿ កប់ក្នុងលុងអាយុលិចជីកនៅនាង វិចយកអាចម៉ែនី
ដីមកពុនសង្គត់អាយុណែន បន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើបានជាតិ
ឡើង អាយុជាតិ។
 - ✿ ត្រូវត្រូវបានប្រើបានជាតិ នៅពេលល្អាចអាយុ
ជាតិលូម៉ែត់។

៣- ភាពិប័ណ្ឌដើម្បីទន្លេ:

- * ក្រោយដំឡើងតាមរបៀប ធ្វើការពារសត្វលូត
ណា ក្នុងករិតប្រឈម 30cc លាយជាមួយទីក
១៦២ បានបញ្ជាល់ក្នុងលូង ដើម្បីការពារក្នុង^២
សត្វលូតសុ បុរាណដើម្បីលួងចោល រៀងរាល់ខ្លួន

ឡេព្រៃចុមងរបុតដល់កូនលូងមានដោមបីន

- * ជំបានរយៈពេល ១ខែ បើមានស្អាត់ដុរីឡើង គល់ល្អុង យើងត្រូវដោកវាបច្ចុប្បន្នអស់ ពីរោះ បើទុកវាគ្មេងដើម្បីមានការលើតលាស់យើត។
 - * ក្រោយពេលសំភាពស្អាតរួចហើយយើងត្រូវដុរីនិងពួនគល់ល្អុងមួន។ រយៈពេល ២ខែបន្ទាប់ពីជំបានដើម្បីមានកំពស់ត្រឹមដង្គែង យើងត្រូវធ្វើស្អាត តាមគល់ល្អុង និងដុរីពួនគល់មួនឡើត ដោយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្របតាមរយៈល្អុងដិតបច្ចុប្បន្នជាប់។
 - * បន្ទាប់ពីដុរីពួនគល់លើកទី២រួចហើយ យើងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្របតាមរយៈល្អុងមោយជាគសិនទេ។ បើយើងយកជីវិតមកបានយ៉ាងឡើត។ មួននេះគឺជាដឹកស្របតាមគល់ល្អុងដែរ។

