



ពូជពោត ល្បឿងមង្គល

Loeung Mongkul



វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
Cambodian Agricultural Research and Development Institute

ប្រវត្តិរបស់ពូជ

ពូជពោត "ល្បឿងមង្គល" ត្រូវបានរំដោះដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៦ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ ពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ ពូជនេះមាន ប្រភពដើមចេញពីស្រឡាយ COTAXTLA-S0031 របស់វិទ្យាស្ថានស៊ីមីត (CIMMYT) ដែលស្ថិតនៅប្រទេសមិចស៊ិកូ ។

លក្ខណៈពិសេសៗ របស់ពូជពោត "ល្បឿងមង្គល"

លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

ពូជពោត "ល្បឿងមង្គល" មានលក្ខណៈដើមដងរឹងមាំ ស្លឹកមានពណ៌ បៃតងចាស់ ហើយដុះលូតលាស់យ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីដាំបាន ១៥-២០ ថ្ងៃ ។ ប្រព័ន្ធបូសមានការដុះលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង មានតួនាទីទប់ដើម មិន ឱ្យដួលរលំដោយសារខ្យល់ និងនៅពេលដើមចាប់ផ្តើមស្ងួត ឬងាប់។ ដើមមានកំពស់ជាមធ្យមពី ២ ម៉ែត្រ ទៅ ២.៥ ម៉ែត្រ ។ កំពស់ផ្លែពីដី គឺ ពី ៨៥ សង់ទីម៉ែត្រទៅ ១ ម៉ែត្រ ។ ផ្លែមានរាងទ្រវែង ប្រវែងពី ១៥ សង់ទីម៉ែត្ររហូតដល់ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ ។ គ្រាប់មានពណ៌លឿងចាស់ រាងដូចធ្មេញកោងរលោងផ្នែកខាងខ្នង ចំនួនជួររបស់គ្រាប់ក្នុងមួយផ្លែពី ១២-១៦ ជួរ និងទំងន់ ១០០០ គ្រាប់ស្មើនឹង ៣០០ ក្រាម ។



ទិន្នផល

ពូជពោត "លឿងមង្គល" អាចផ្តល់ទិន្នផលជាមធ្យម ៤,០ តោន ក្នុងមួយហិកតា ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌអាចផ្តល់ផលរហូតដល់ ១០,០ តោន ក្នុងមួយហិកតា ។

ការប្រើប្រាស់ពូជ

ការដាំដុះពូជពោត "លឿងមង្គល" លើផ្ទៃដី ១ ហិកតា ត្រូវការពូជពី ៣០ ទៅ ៣៥ គីឡូក្រាម (ដាំ ២-៣ គ្រាប់/គុម្ព) ។

វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

គេអាចធ្វើការដាំដុះដំណាំពោតបានពេញមួយឆ្នាំ ដោយការបុកដាំ ការដាំជាជួរ ឬដាំតាមចង្កូរដូចតារាងខាងក្រោម ។

ចន្លោះជួរ (ស.ម)	ចន្លោះគុម្ព (ស.ម)	
	១ ដើម/គុម្ព	២ ដើម/គុម្ព
៦៥	៣០	៦០
៧០-៨០	២៥	៥៥
៨៥-៩៥	២០	៤០



មុនពេលដាំត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកត្រាំទឹកឱ្យបានពី ៤-៦ ម៉ោងដើម្បីឱ្យគ្រាប់វិកលដុះ (តំបន់ដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់) ដោយដាក់គ្រាប់

ក្នុងមួយរណ្តៅពី ២-៣ គ្រាប់ និងជម្រៅពី ២-៤ ស.ម ។ នៅរដូវប្រាំង ត្រូវធ្វើការស្រោចស្រពដើម្បីឱ្យបានជោគជ័យពេលដាំ ចំពោះតំបន់ដាំដុះដែលអាស្រ័យទឹកភ្លៀង យើងត្រូវដាំគ្រាប់ស្លូតដោយមិនចាំបាច់ត្រាំទឹកទេ ។ ការកាត់រំលោះដើមគឺអាចធ្វើនៅពេលកូនពោតមានអាយុបាន ១០ -១៥ ថ្ងៃដោយទុកតែមួយដើមក្នុងមួយគុម្ព និងធ្វើការសម្អាតស្មៅឱ្យស្អាតជៀសវាងការប្រជែងស្រូបយកជីជាតិពីដំណាំ ដែលបណ្តាលឱ្យដំណាំក្រិន មិនសូវលូតលាស់ និងផ្តល់ផលតិច ។

ការដុះលូតលាស់

ការធ្វើដីបានផុសល្អ ដីមានជីជាតិ សំណើមគ្រប់គ្រាន់ និងធាតុអាកាសអំណោយផលនោះក្រោយពីដាំបានចំនួន ៥-៦ ថ្ងៃ គ្រាប់ចាប់ផ្តើមដុះ ពន្លកទូលដើមខាងលើ និងក្រោយពីដាំបានចំនួន ១៥-២០ ថ្ងៃ ការដុះលូតលាស់របស់ពូជនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងលឿន និងមានកំពស់ពី ៥០ - ៧០ សង់ទីម៉ែត្រ ដើមថ្លោស ស្លឹកឡើងពណ៌បៃតងចាស់ ។ ពូជនេះចាប់ផ្តើមចេញផ្កាឈ្មោលនៅពេលបានអាយុកាល ៥១-៥៣ ថ្ងៃក្រោយពីដាំ និងចេញផ្កាញីនៅពេលបានអាយុកាល ៥៣-៥៥ ថ្ងៃក្រោយពីដាំ និងចាប់ផ្តើមទុំនៅរយៈពេល ៥៥-៦០ ថ្ងៃ ក្រោយពីចេញផ្កាញី ។

ការប្រើប្រាស់ជី

ការប្រើប្រាស់ជីតាមបច្ចេកទេស និងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាធ្វើឱ្យដំណាំដុះលូតលាស់ល្អ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ។ ជីដែលអាចប្រើប្រាស់គឺអាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម (N : P₂O₅ : K₂O) ។ កម្រិតនៃប្រើប្រាស់ជី អាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទដី ។ ការប្រើប្រាស់ជីចែកចេញជាបីដំណាក់កាល គឺដាក់ទ្រាប់បាតមុនពេលដាំ ដោយប្រើប្រាស់ជីអាសូត (៥០%) ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម (១០០%) ចំណែកអាសូតនៅសល់ (៥០%) ប្រើសម្រាប់ដាក់បំប៉នចំនួនពីរលើកទៀត គឺលើកទី ១ (២៥%) ក្រោយពីដាំ

បាន ២០-២៥ថ្ងៃ និងបំប៉នលើកទី ២ (២៥%) ក្រោយពីដាំបាន ៤០-៤៥ ថ្ងៃ ។ ការដាក់ដី គឺយើងត្រូវដាក់ឱ្យឆ្ងាយពីគល់ពី ១០-១៥ ស.ម រួចពូន ដីលប់ឱ្យជិត ដើម្បីទប់គល់ពោតផង និងការពារជីមិនឱ្យបាត់បង់តាម រយៈការហើរទៅក្នុងបរិយាកាស និងការហូរច្រោះដោយសារទឹក ។

ដី	កម្រិតដីទៅតាមប្រភេទដី (តក្រ/ហត)				
	ដីខ្សាច់ (ព្រៃខ្នែរ, ប្រទះឡាង)	ដីគង្គ (កំពង់សៀម)	ដីក្រហម (ឡាបានសៀក)	ដីកណ្តុង (ទួលសំរោង)	ដីល្បាប់ (កៀនស្វាយ)
អ៊ុយរ៉េ	១២៤	១៧៤	១៧៤	១៧៤	១៥០
ដេ អា ប៊េ	៩៥	១០៧	១០៧	១០៧	៨៥
ប៊ូតាស្យូម	៣៧	៤៥	៤៥	៣៧	៥៤

ការប្រមូលផល

គេអាចប្រមូលផលពោត នៅពេលដើមពោតចាប់ផ្តើមប្រែពណ៌ពីសំបក ក្តាមទៅលឿងស្អុត ឬងាប់ដើម សំបកផ្ទៃមានពណ៌លឿងស្អុតហើយ ស្រួយ សក់ពោតឡើងស្អុត ឬសំគាល់មួយផ្នែកទៀតនៅលើគល់របស់ គ្រាប់ឡើងពណ៌ប្រផេះគឺនៅពេលពោតបានអាយុកាលពី ១០០- ១១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំ ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលផល នៅរដូវភ្លៀង ធ្លាក់ជោតជាំ អាចធ្វើឱ្យផលនៃគ្រាប់ពោតធ្លាក់ចុះ និងបាត់បង់គុណ ភាពដោយសារទឹកភ្លៀងជ្រាបចូលក្នុងផ្លែបណ្តាលឱ្យគ្រាប់ដុះ ឬកើត ជម្ងឺផ្សិតលើគ្រាប់ ។



ការទុកក្រោយពេលប្រមូលផល

ជាមធ្យមសំណើមគ្រាប់ក្រោយពេលប្រមូលផលគឺពី ១៨-២០% ដូច្នេះ តម្រូវឱ្យយើងធ្វើការហាលសម្ងួតបន្ថែមទៀតដោយកំដៅថ្ងៃ ។ ត្រូវ ឧស្សាហ៍ប្រែត្រឡប់គ្រាប់ខណៈកំពុងហាល ដើម្បីឱ្យគ្រាប់ឆាប់ស្ងួតល្អ ។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការហាលសម្ងួត និងទុកដាក់គ្រាប់ពោតមិនបានល្អ ក្រោយពេលប្រមូលផល អាចធ្វើឱ្យកើតសត្វល្អិតចង្រៃ ដូចជាខ្លូត ជា ដើមដែលវាបានស៊ីបំផ្លាញគ្រាប់ពោតតាំងពីនៅលើដើមរហូតដល់គ្រាប់ នៅក្នុងកន្លែងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឱ្យបាត់បង់ គុណភាពដូចជា គ្រាប់កើតជម្ងឺផ្សិតផ្សេង គ្រាប់ឡើងផ្លូវដែលជាហេតុធ្វើ ឱ្យតម្លៃគ្រាប់ពោតធ្លាក់ចុះ ។

ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ

ពូជពោត " លឿងមង្គល " ជាពូជដែលអាចរក្សាគ្រាប់ពូជទុកដាំដុះនៅ រដូវបន្ទាប់ទៀតបាន មិនដូចពូជពោតអ៊ីប៊ីដេ ប្រសិនបើយើងដាំដុះ វានៅដាច់តែឯងគ្មានពូជពោតផ្សេងនៅក្បែរ ។ ការរក្សាគ្រាប់ពូជ ទុកសំរាប់ប្រើនៅរដូវបន្ទាប់ ត្រូវមានសំណើមពី ១៣-១៥% គឺទុកនៅ កន្លែងស្ងួតល្អ ឬរក្សាទុកក្នុងធុងបិទជិត ឬអាចទុកដាក់ដោយប្រើប្រាស់ ថ្នាំការពារសត្វល្អិត ។



រៀបចំដោយ ចង្អុលចណ្តលរុក្ខចម្រើនវិទ្យា វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)